

《接種新型冠狀病毒疫苗知情同意書》

更新日期：2021/10/19

受種者資料

姓名：_____ 性別：_____ 出生日期：_____

身份證明文件類別：_____ 證件編號：_____

就讀學校：_____ 班別：_____ 學號：_____

家長 / 法定監護人姓名：_____ 聯絡電話：_____

接種疫苗及地點

接種疫苗種類及名稱：_____ [請填寫滅活疫苗(國藥中國生物北京)或 mRNA 疫苗(BioNTech)]

接種地點：_____ (請填寫學校或接種站點)

《接種新型冠狀病毒疫苗知情同意書》

1. 新型冠狀病毒肺炎是一種傳染性很強的傳染病，可在家庭、工作間和公共場所迅速傳播，可引起肺炎等嚴重疾病，病死率較高，部分病人治癒後會有肺纖維化等後遺症。
2. 多種類型的新型冠狀病毒疫苗已開始在世界各地大量生產及使用。接種新型冠狀病毒疫苗，是預防新型冠狀病毒肺炎(以下簡稱新冠肺炎)最有效的方法，能有效減少新冠肺炎發病率、嚴重率及病死率。社區中大部分人接種新型冠狀病毒疫苗後，亦能產生一定的群體免疫，減少新型冠狀病毒的傳播。
3. 衛生局現根據風險高低依序向澳門居民、外地僱員及依法在澳長期逗留的非澳門居民提供新型冠狀病毒疫苗接種。衛生局提供的新型冠狀病毒疫苗均已在第三期臨床研究的中期結果中顯示良好的效力和安全性，其已知和潛在好處遠大於其已知和潛在的風險，並已在世界各地大規模使用。
4. 但由於新型冠狀病毒疫苗研發時間較短，其長期效力和安全性有待進一步證實，目前大部分國家和地區以緊急使用許可或附條件上市許可方式批准使用，本澳亦以同樣方式批准使用。
5. 接種新型冠狀病毒疫苗常見副作用一般為接種部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、關節痛、發冷和發熱，強度通常為輕度或中度，並在接種後幾天內消失。
6. 和其他藥物或疫苗一樣，極少數人會出現嚴重的過敏反應，對疫苗中任何成份有嚴重的過敏反應者不能接種有關疫苗。接種後所有人士應在接種站休息至少 30 分鐘才離開，期間或其後一旦出現任何不適，應立即向現場的醫護人員求助。
7. 患有發熱性疾病或其他急性疾病者，以及慢性病急性發作者須暫緩接種或由醫務人員評估後才可接種。疫苗對胎兒的安全性未經測試，除非前往高風險地區，建議孕婦暫緩接種。不同疫苗由於臨床試驗數據不同，適用的年齡有所不同。請仔細填寫評估問卷並經醫務人員評估後才可接種。目前各類疫苗暫定適用年齡為：
 - 滅活疫苗(國藥中國生物北京): ≥ 12 歲；
 - mRNA 疫苗(BioNTech): ≥ 12 歲。
8. 須接種同一疫苗 2 劑後 1 至 2 周才能達到疫苗臨床試驗結果所預期的效力。2 劑之間一般相隔 4 周，除特殊情況外，2 劑接種應使用同一款疫苗。
9. 須留意，如其他任何疫苗一樣，新型冠狀病毒疫苗的效力並非百分百，受種者仍須做好防護措施。
10. 有關各種疫苗的詳細資料可參考相應的說明。如有疑問，可向醫務人員查詢。

備註：新冠疫苗具有良好的安全性和有效性。惟為加強市民接種疫苗的信心，特區政府已為每位 86 歲以下的受種者購買保險，以對因疫苗引起的身故或完全及永久殘障的受種者和家屬提供保障。